

本文件根據自艾伯塔省衛生服務局的資源/資料改編，並由第三方翻譯。

AHS 校園疫苗接種計劃概覽 (家長版)

2022 年 11 月 21 日

將在學校為哪些年級的學生接種哪些疫苗？

年級	疫苗	附加資訊
6 年級	乙型肝炎 (HBV) 疫苗	<ul style="list-style-type: none">6 年級期間接種 2 劑，間隔 6 個月HBV 疫苗 常見問題解答更多關於 HBV 疫苗的資訊，請瀏覽 Immunize AB 網站
	人類乳頭瘤病毒 (HPV-9) 疫苗	<ul style="list-style-type: none">6 個月內接種 2 劑 (6 年級期間)HPV-9 疫苗 常見問題解答更多關於 HPV-9 疫苗的資訊，請瀏覽 Immunize AB 網站
9 年級	百白破 (dTap) 疫苗	<ul style="list-style-type: none">9 年級期間接種 1 劑 (除幼兒時期曾接種過 dTap 疫苗外，仍可接種)dTap 疫苗 常見問題解答更多關於 dTap 疫苗的資訊，請瀏覽 Immunize AB 網站
	流行性腦脊髓膜炎 (MenC-ACYW) 疫苗	<ul style="list-style-type: none">9 年級期間接種 1 劑MenC-ACYW 疫苗 常見問題解答更多關於 MenC-ACYW 疫苗的資訊，請瀏覽 Immunize AB 網站

何時可知曉學校的疫苗接種日期？

您孩子的學校會通知您疫苗接種日期。

同意我的孩子參加校園疫苗接種計劃需要完成什麼手續？

孩子在學校接種疫苗之前，需徵得父母同意。學校會發給您要接種之疫苗的相關資訊及同意書，同意書中有一些關於您孩子健康狀況的問題需要您回答，包括身體狀況和過敏史。透過此同意書，我們可確保您的孩子能安全地接種相關疫苗。請務必閱讀同意書以及提供給您的所有其他資訊，並完整地填寫。

請注意，對於學校提供的每種疫苗，您都會收到一份相關的新資訊包和同意書。如果您同意接種某種疫苗，即表示您同意孩子接受該疫苗所需的全部針劑。您的孩子可能需要超過 1 學年才能接

種完每種疫苗的全部針劑。在您的孩子接種完所需的全部針劑之前，您的同意書將一直有效，除非您撤回（收回）同意書或您孩子的健康狀況發生變化。如果您孩子的健康狀況發生變化或您想撤回同意書，請致電學校的公共衛生護士並告知相關情況。

學校將向學生分享有關疫苗接種的哪些資訊？

學校將向學生介紹他們可以接種哪些疫苗，以及這些疫苗將如何在體內產生免疫作用。學生們還將了解到接種當天會發生什麼，以及他們可以做哪些準備，包括體驗管理策略。此外，還有一些要帶回家給父母了解以及需要帶回到學校的資訊/資料。如有任何疑問，將在此期間解答。

我可以為孩子接種疫苗做哪些準備？

1. 與孩子討論疫苗接種事宜。年齡稍大的兒童和青少年更可能對他們為什麼要接種疫苗有疑問，現在正是幫助他們了解接種疫苗有助防止生病的好時機。
2. 告訴孩子您過去為幫助他們接種疫苗而做了哪些事情。這可以幫助您和孩子確定他們可以使用的策略，以減輕他們在接種之前或期間可能會產生的焦慮情緒。
3. 幫助孩子做好準備，並為他們提供一些能夠分散注意力以及安慰他們的協助。
4. 如果您的孩子存在下列情況，請及時告知學校的公共衛生護士：
 - 曾在接種疫苗後出現過嚴重的副作用；
 - 存在資訊表的「哪些人不應該接種這種疫苗」部分中所列的任何情況；
 - 由於服藥或健康狀況導致免疫系統較弱；或者
 - 在其他地方（例如在醫師或藥師處或其他省的旅遊診所）接種過這些疫苗

如需詳細了解如何改善您孩子的疫苗接種體驗，請瀏覽：

- [舒適承諾 | 艾伯塔省衛生服務局](#)
- [改善疫苗接種體驗：父母與照護者指南](#)
- [幫助兒童接種疫苗的技巧 \(albertahealthservices.ca\)](#)

孩子在接種疫苗後會有什麼反應？

您的孩子在接種疫苗後可能出現的副作用取決於他們所接種的疫苗。若要查找此類資訊，請點擊[常規免疫接種計劃](#)或[疫苗資訊表](#)清單中的疫苗名稱。公共衛生護士將要求您的孩子在接種疫苗後留觀至少 15 分鐘，以便其能夠發現並處理可能出現的任何速發型過敏反應。

出現嚴重副作用的情況很少見。可撥打 **Health Link** 熱線 811 報告任何嚴重或罕見的副作用。

接種疫苗後如何管控孩子出現的症狀？

無論孩子年齡大小，在接種疫苗後一般會出現一些常見、輕微、暫時性的症狀。

以下是管控這些輕微症狀的一些技巧：

- 發燒。有些藥物（例如對乙酰氨基酚或布洛芬）可以幫助退燒。如果您不確定要給孩子服用什麼藥物或不清楚服藥劑量，請諮詢藥師或醫師。按照包裝上的說明用藥。如果您不確定孩子的發燒症狀是否與接種疫苗有關，請在給孩子服藥之前撥打 **Health Link** 熱線 811 或者諮詢藥師或醫師。

- 接種部位紅腫或感覺疼痛。在接種部位放一塊涼的濕布。有一些藥物可以幫助緩解疼痛。如果您不確定要服用什麼藥物或不清楚服藥劑量，請諮詢藥師或醫師。按照包裝上的說明用藥。
- 18 歲以下的兒童不得服用阿司匹林。阿司匹林會增加患上雷爾氏綜合徵的風險，這是一種罕見的嚴重疾病。
- 感覺疲勞、容易煩躁、不想進食。有時在接種疫苗後的數小時內，孩子會感到疲勞、容易煩躁，並且不想進食。接種疫苗後安排在家中安靜的環境裡放鬆休息。在需要時抱抱孩子，注意保持舒適的溫度；如果太熱，孩子會更容易煩躁。

可以在哪裡獲取更多資訊？

- 父母與照護者指南：[改善疫苗接種體驗](#)
- 學生：[如何擁有更積極的疫苗接種體驗](#)
- 艾伯塔省 [疫苗接種時間表](#) | [艾伯塔省衛生服務局](#)
- [舒適承諾](#) | [艾伯塔省衛生服務局](#)
- [艾伯塔省免疫接種](#) | [艾伯塔省衛生服務局](#)

如果還有任何其他疑問，應該聯絡誰？

請聯絡學校行政人員及/或為您孩子所就讀學校指派的公共衛生護士。